

Insecticidas recomendados para el control de *Bradysia spp.*

Tipo	Materia activa	Nombre/s comercial/es	Formulación	Grupo (IRAC)	Tiempo de reingreso	Clase	Observaciones
Neonicotinoide (Neuroactivo)	Imidacloprid	Confidor	Suspensión concentrada	4 ^a	12	II	Efecto residual prolongado si se aplica al sustrato a través del riego. No aplicar sobre suelos o sustratos saturados de agua.
Regulador del crecimiento	Azadiractina	Glaxosan Bio Neem	Concentrado emulsionable	UN	4	IV	Sistémico de amplio espectro; es repelente, inhibidor del apetito, de la oviposición y del crecimiento.
	Cyromazina	Trigard 75	Polvo mojable	17	12	IV	Controla larvas por contacto o ingestión. Mínimo impacto sobre insectos beneficiosos.
	Diflubenzuron	Difluman	Suspensión Concentrada	15	12	III	Actúa por contacto e ingestión. Aplicar sobre los primeros 5 cm del sustrato, por riego o pulverización.
	Piriproxifen	Dragon	Concentrado emulsionable	7	12	III	Aplicar con un intervalo de 6 meses.
Organofosforado	Acefato	Gangster	Polvo soluble	1B	12	III	Sistémico, adulticida.
	Clorpirifos	Clorpirifos agm	Concentrado emulsionable	1B	12	II	Actúa por contacto, ingestión e inhalación.
	Diazinon	Diazol 50	Emulsión aceite en agua	1B	12	II	Menor cantidad de inertes; otorga menor riesgo fitotóxico.
Piretroide	Bifentrin	Zamuray 10	Concentrado emulsionable	3	12	II	Adulticida. Baja dosis. Actúa por contacto e ingestión.
	Fenpropatrin	Danitol 10	Concentrado emulsionable	3	24	II	Adultos. Bajo volumen.
	Deltametrina	Glaxosan Delta-T	Concentrado emulsionable	3	12	III	Marcado poder de volteo. Alta acción residual